

## ИНСТРУКЦИЯ

### по применению Азинокса® ветеринарного для профилактики и лечения цестодозов кошек и собак (организация-разработчик: ООО «Экохимтех», г. Уфа)

#### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Азинокс® ветеринарный. Международное непатентованное наименование: Празиквантел.
2. Лекарственная форма: таблетки для перорального применения. Таблетка препарата содержит в качестве действующего вещества 0,05 г празиквантела, а в качестве вспомогательных веществ лактозу – 0,200 г, крахмал – 0,044 г, кальция стеарат – 0,003 г, тальк – 0,003 г. По внешнему виду Азинокс® ветеринарный представляет собой таблетки белого или белого с розоватым, желтоватым или сероватым оттенком цвета плоскоцилиндрической формы с риской и фаской. Препарат расфасован по 10 штук в блистеры из фольги или бумаги ламинированной; по 30 и 100 штук в банки полимерные. Блистеры и банки по 30 таблеток по 1 штуке помещают в пакеты или коробки из картона вместе с инструкцией по применению.
3. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства. Запрещается использовать Азинокс® ветеринарный по истечении срока годности.
4. Азинокс® ветеринарный хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25 °С.
5. Азинокс® ветеринарный следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

#### II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Азинокс® ветеринарный относится к группе антигельминтных препаратов. Активен в отношении цестод, паразитирующих у собак и кошек. Празиквантел повышает проницаемость мембран клеток гельминтов для ионов кальция, что вызывает генерализованное сокращение мускулатуры паразитов, приводящее к их гибели. Действует на все стадии развития ленточных гельминтов, в том числе *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus granulosus*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides lineatus* и др., паразитирующих у животных. Быстро всасывается при приеме внутрь. Максимальной концентрации в плазме крови достигает через 1–2 часа. Выводится до 80 % в виде метаболитов почками в течение 4 суток. Препарат полностью элиминируется из организма через 15 суток после окончания приема последней дозы. Азинокс® ветеринарный по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и sensibilizing действия.

#### III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Азинокс® ветеринарный применяют собакам и кошкам для профилактики и лечения цестодозов (эхинококкоз, альвеококкоз, мезоцестидоз, дипилидиоз, дифиллоботриоз).

9. Азинокс® ветеринарный противопоказан беременным и лактирующим самкам, щенкам и котятм до трехмесячного возраста, а также больным и ослабленным животным.
10. Азинокс® ветеринарный применяют с профилактической и лечебной целью индивидуально, однократно, в утреннее кормление с небольшим количеством корма (в куске колбасы, мяса, с фаршем, кашей) в дозе 5 мг на 1 кг массы животного (1 таблетка на 10 кг). Для животных массой меньше 5 кг, 1/2 таблетки измельчить и смешать с 5 мл кипяченой воды. Применять внутрь из расчета 1 мл приготовленной суспензии препарата на 1 кг массы животного. Для лечения препарат применяют однократно. Профилактическую дегельминтизацию животных проводят 1 раз в 3 месяца, а также за 10 дней до вакцинации. Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств не требуется.
11. Симптомов, возникающих при передозировке препарата, не установлено.
12. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.
13. В случае несоблюдения установленного срока повторных профилактических обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.
14. Побочных явлений при применении Азинокса® ветеринарного в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной чувствительности к празиквантелу возможны нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции. В случае возникновения побочных реакций следует применять противосудорожные и противовоспалительные средства, снижающие концентрацию празиквантела в плазме крови.
15. Запрещается применять совместно с рифампицином.
16. Азинокс® ветеринарный не предназначен для применения продуктивным животным.

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с Азиноксом® ветеринарным следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.
18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Азиноксом® ветеринарным. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).
19. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.
20. Организация-производитель: ООО «Экохимтех», 450029, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65. Инструкция разработана: ООО «Экохимтех», 450029, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65. Рекомендовано к регистрации в ФБГУ «ВГНКИ»  
Номер регистрационного удостоверения 56-3-11.17-3875 №ПВР-3-30.12/02872