



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

**8 (495) 211-99-91**

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж **8 (495) 260-13-21**

E-mail: [mediavetservis@mail.ru](mailto:mediavetservis@mail.ru)


Сайт: <http://medvs.ru>



2019

**ДОКСИМЕД ОРАЛЕ**

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ



# ДОКСИМЕД ОРАЛЕ

## АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

### ОПИСАНИЕ

Антибактериальный комбинированный препарат на основе доксициклина и аскорбиновой кислоты. Представляет собой порошок от светло-желтого до желтого цвета.

### СОСТАВ

В 1 г препарата содержится 100 мг доксициклина гидрохлорида, 80 мг кислоты аскорбиновой и вспомогательные вещества до г.

### Срок годности 2 года

Хранят с предосторожностью (по списку Б) в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5°C до 25°C.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат применяют молодняку крупного рогатого скота, свиней и птице в качестве лечебно-профилактического средства при заболеваниях, вызываемых чувствительными к доксициклину микроорганизмами.

Свиньи: энзоотическая пневмония, актинобациллярная плевропневмония, атрофический ринит, сальмонеллёз, лептоспироз, колибактериоз, дизентерия.

Крупный рогатый скот: сальмонеллёз, колибактериоз, хламидиоз, стафилококкоз, стрептококкоз, энтериты, энцефалиты, артриты, бурситы, кератоконъюнктивиты, пневмонии и бронхопневмонии, желудочно-кишечные и респираторные инфекции, актиномикоз.


Птица: хронические респираторные заболевания, воспаление воздушных мешков у индеек, инфекционный синовит, пастереллёз, хламидиоз, колибактериоз, некротический энтерит, бордетеллёз индеек; профилактика стрессов.

При применении препарата возможны аллергические реакции. При их развитии применение доксимеда прекращают и назначают препараты кальция и антигистаминные средства.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обладает антибактериальным эффектом широкого спектра действия, оказывает иммуностимулирующий, антиоксидантный и антитоксический эффект.

Обладает выраженным действием в отношении грамположительных (*Bacillus* spp., *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium* spp.), грамотрицательных (*Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Enterobacter* spp., *Treponema* spp., *Actinobacillus* spp., *Bordetella* spp., *Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp., *Mannheimia haemolytica*) бактерий, а также микоплазм, хламидий, боррелий и лептоспир.



### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат не следует применять одновременно с антибиотиками группы пенициллина и полимиксина, препаратами кальция, магния и алюминия, молоком и молочными продуктами.

Запрещено применять доксимед курам-несушкам и ремонтному молодняку за 20 суток до начала яйцекладки.

### СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 20 суток после последнего применения препарата.

Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.