

# ЭНРОФЛОКСАВЕТФЕРОН-Б

45

## НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ КРС, МРС

### ОПИСАНИЕ

Препарат «Энрофлоксаветферон-Б» представляет собой прозрачную жидкость от зеленовато-жёлтого до коричневого цвета. Допускается опалесценция и выпадение кристаллов в препарате, которые при встряхивании должны растворяться.

### СОСТАВ

В 1 см<sup>3</sup> препарата содержится 0,05 г энрофлоксацина и не менее 1,0x10<sup>4</sup> ТЦД50/см<sup>3</sup> по антивирусной активности белка альфа-интерферона бычьего рекомбинантного. Действующие вещества растворены в растворителе с добавлением стабилизаторов.

 Срок годности 18 месяцев



### ПРИМЕНЕНИЕ

«Энрофлоксаветферон-Б» относится к комплексным препаратам и предназначен для лечения крупного рогатого скота при болезнях бактериальной, вирусной и бактериально-вирусной этиологии (колибактериоз, клебсиеллез, пастереллез, псевдомоноз, хламидиоз, кампилобактериоз, стрептококкоз, стафилококкоз, клостридиозы, некробактериоз, сальмонеллез, микоплазмоз, мастит, эндометрит, парагрипп-3, инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея, рота-и коронавирусная инфекции, респираторно-синцициальная инфекция и др.). С лечебной целью препарат вводят внутримышечно или подкожно в объеме 1,0 см<sup>3</sup> на 10 кг массы животного и 10 – 15 см<sup>3</sup> животным массой более 100 кг с интервалом 24 часа в течение 3 - 5 дней. С профилактической целью (при формировании групп и угрозе распространения колибактериоза, клебсиеллеза, пастереллеза, псевдомоноза, хламидиоза, кампилобактериоза, стрептококкоза, стафилококкоза, клостридиоза, некробактериоза, сальмонеллеза, микоплазмоза, парагриппа-3, мастита, эндометрита, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, рота-и коронавирусной инфекций, респираторно-синцициальной инфекции и др.) препарат назначают двукратно с интервалом в 24 часа внутримышечно или подкожно в объеме 1,0 см<sup>3</sup> на 10 кг массы животного и 10 – 15 см<sup>3</sup> животным массой более 100 кг.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат нельзя смешивать в одном шприце с другими лекарственными препаратами.

Препарат не рекомендуется применять в период беременности и при повышенной чувствительности к фторхинолонам.

Не рекомендуется применять препарат одновременно с хлорамфениколом, макролидами, тетрациклином, теофиллином или с нестероидными противовоспалительными средствами.

При внутримышечном введении запрещается вводить более 10 мл в одну точку.

### СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после последнего применения препарата. Молоко в пищу людям разрешается использовать не ранее, чем через 4 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.