



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

**8 (495) 211-99-91**

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж **8 (495) 260-13-21**

E-mail: [mediavetservis@mail.ru](mailto:mediavetservis@mail.ru)


Сайт: <http://medvs.ru>



2019

**КОЛИМЕД**

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ



# КОЛИМЕД

## АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

### ОПИСАНИЕ

Препарат по внешнему виду представляет собой порошок от белого до светложёлтого цвета, с характерным запахом, растворим в воде.

### СОСТАВ

В 1 г которого содержится колистина сульфата 5 млн. МЕ и наполнитель.

### Срок годности 2 года

Хранят с предосторожностью (по списку Б) в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5°C до 25°C.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат применяют для лечения у телят, поросят и цыплят-бройлеров гастроэнтеритных инфекций бактериальной этиологии:

- сальмонеллеза,
- колибактериоза
- и других заболеваний, вызванных микроорганизмами чувствительными к колистину сульфату.

Колимед применяют цыплятам-бройлерам в дозе 2,5 - 4 г препарата на 10 л воды для питья.

Раствор препарата готовят из расчёта суточной потребности птицы в воде.

Цыплята-бройлеры получает воду, содержащую Колимед, в качестве единственного источника питья 3-5 дней.

Препарат задают телятам и поросятам в дозе 0,2 - 0,25 г на 10 кг живой массы тела с водой или молоком.

Продолжительность лечения 3-5 дней.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Действие препарата Колимед обусловлено свойствами колистина сульфата входящего в его состав. Колистина сульфат - циклический полипептидный антибиотик, синтезируемый аэробной спорообразующей палочкой *Bacillus polymyxa* и действующий на грамотрицательные микроорганизмы.

Препарат обладает широким спектром действия. Активен в отношении

- *E.coli*,
- *Streptococcus spp.*,
- *Enterobacter spp.*,
- *Staphylococcus spp.*,
- *Chlamydia spp.*,
- *Salmonella spp.*,
- *Bordetella spp.*,
- *Pasteurella spp.* и других.

Механизм действия колистина заключается в нарушении фосфолипидов цитоплазматической оболочки бактерии, в результате этого изменяется проницаемость оболочки.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Побочных явлений и осложнений при применении препарата Колимед, в соответствии с настоящей инструкцией, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам лекарственного препарата и появлении побочных явлений его использование прекращают.

Не использовать препарат вместе с пенициллинами и цефалоспоридами!

### СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой птицы, телят и поросят на мясо разрешается через 2 суток, после последнего применения препарата.

