

Рассмотрено на заседании
Ветбиофармсовета
протокол № 67
от «15» июля 2013 года

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного препарата
Колимед

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Колимед (Kolimedum).
- 1.2 Препарат по внешнему виду представляет собой порошок от белого до светло-жёлтого цвета, с характерным запахом, растворим в воде. В 1 г которого содержится колистина сульфата 5 млн. МЕ и наполнитель.
- 1.3 Колимед расфасовывают в полиэтиленовые пакеты из металлизированной полиэтиленовой пленки массой нетто 100, 200, 250, 500 и 1000 г или полипропиленовые банки по 50, 100, 200, 250, 500 и 1000 г.
- 1.4 Препарат хранят препарат с предосторожностью (список Б) в закрытой заводской упаковке в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте, при температуре от 5° до 25° С.
- 1.5 Срок годности препарата 2 года от даты изготовления.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1 Действие препарата Колимед обусловлено свойствами колистина сульфата входящего в его состав. Колистина сульфат - циклический полипептидный антибиотик, синтезируемый аэробной спорообразующей палочкой *Bacillus polymyxa* и действующий на грамотрицательные микроорганизмы. Механизм действия колистина заключается в нарушении фосфолипидов цитоплазматической оболочки бактерии, в результате этого изменяется проницаемость оболочки.
- 2.2 После перорального введения колистин, практически, не всасывается в желудочно-кишечном тракте и не накапливается в органах и тканях.
- 2.3 Препарат обладает широким спектром действия. Активен в отношении *E.coli*, *Streptococcus spp.*, *Enterobacter spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Chlamydia spp.*, *Salmonella spp.*, *Bordetella spp.*, *Pasteurella spp.* и других.
- 2.4 Препарат характеризуется высокой биологической доступностью и низкой токсичностью. Выводится из организма в основном с калом и мочой.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- 3.1 Препарат применяют для лечения у телят, поросят и цыплят-бройлеров гастроэнтеритных инфекций бактериальной этиологии: сальмонеллеза, колибактериоза и других заболеваний, вызванных микроорганизмами чувствительными к колистину сульфату.
- 3.2 Колимед применяют цыплятам-бройлерам в дозе 2,5 – 4 г препарата на 10 л воды для питья. Раствор препарата готовят из расчёта суточной потребности птицы в воде. Цыплята-бройлеры получают воду, содержащую Колимед, в качестве единственного источника питья 3-5 дней.

Препарат задают телятам и пороссятам в дозе 0,2 – 0,25 г на 10 кг живой массы тела с водой или молоком. Продолжительность лечения 3-5 дней.

3.3 Побочных явлений и осложнений при применении препарата Колимед, в соответствии с настоящей инструкцией, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам лекарственного препарата и появлении побочных явлений его использование прекращают.

3.4 Особые указания. Убой птицы, телят и поросят на мясо разрешается через 2 суток, после последнего применения препарата.

3.5 Противопоказания. Не использовать препарат вместе с пенициллинами и цефалоспорины.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые меры личной гигиены и правила техники безопасности.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, не менее 3-х невскрытых пакетов или банок препарата из серии вызвавшей осложнение, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов г. Минск, ул. Красная 19-а, тел 290-42-75.

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И АДРЕС

6.1 Изготовитель: ЧТУП «Биоветпром», РБ, Минская область, Минский район, д. Королищевичи, ул. Коммунистическая, 41 а, к. 1-1.

Инструкция по применению разработана ветврачом ИП ООО «Рамед» РБ, г. Минск, (О.П. Янукович)

