МВС

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

8 (495) 211-99-91

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж 8 (495) 260-13-21

E-mail: mediavetservis@mail.ru

Сайт: http://medvs.ru

2019

АМОКСИЦИЛЛИН КМ 80%

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

АМОКСИЦИЛЛИН КМ 80%

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

ОПИСАНИЕ

Амоксициллин КМ 80% - противомикробный препарат, представляющий собой порошок от белого до светло-желтого цвета, мало растворимый в воде.

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 800,0 мг амоксициллина тригидрата и наполнитель.

Срок годности 2 года

Хранят с предосторожностью (по списку Б) в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0°С до 25°С.

[!] ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Амоксициллин – полусинтетический антибиотик из группы пенициллина. Обладает широким спектром противомикробного действия.

К амоксициллину чувствительны:

- Staphylococcus spp.,
- Erysipelothrixrhusiopathiae,
- Corynebacterium spp.,
- Clostridium spp.,
- Campylobacter spp.,
- Brucella spp.,
- Salmonella spp.,
- Escherichia coli,
- Haemophilus spp.,
- Bacteroides spp.,
- Fusobacterium necrophorum,
- Proteus spp.
- и другие.

К препарату не чувствительны грибы, хламидии, микоплазмы, риккетсии и вирусы. Амоксициллин оказывает бактерицидное действие.

ПРИМЕНЕНИЕ

Амоксициллин КМ 80% применяют свиньям и птице при: колибактериозе, сальмонеллезе и других инфекционных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину.

Амоксициллин КМ 80% применяют внутрь с кормом или водой 2 раза в сутки в течение 3-7 дней в следующих дозах:

- поросята: 25 -50 мг/кг массы тела в смеси с кормой, водой или молоком 2 раза в сутки в течение 3-5 дней или 100-150 г на 1000 литров воды в течение 3-5 дней;
- свиньи старше 6 месяцев: 25 - 50 мг/кг массы тела 2 раза в сутки в смеси с кормой или водой, или 150-300 г препарата на 1000 литров воды в течение 3-5 дней;
- птица: в первые 10 дней жизни из расчета 125 г на 1000 л воды, в последующие периоды 62,5 - 75 г на 1000 л воды в течение 3-5 дней.

Птице раствор готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. Во время лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется применять препарат животным, имеющим индивидуальную чувствительность к пенициллинам и цефалоспоринам; при нарушении выделительной функции почек.

Запрещается совместное применение препарата с антибиотиками групп тетрациклина, хлорамфеникола, макролидами и линкозамидами; сульфаниламидами.

Запрещается применение препарата курам-несушкам, яйца которых используются в пищу людям.

При применении препарата возможны аллергические реакции (кожная сыпь, эритема, зуд), у поросят - отек прямой кишки; при длительном применении - дисбактериоз. При наличии побочных эффектов применение препарата прекращают.

СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой животных на мясо разрешается через 15 суток, а птицы через 5 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее этого срока, мясо может быть использовано на корм плотоядным животным.