МВС

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

8 (495) 211-99-91

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж 8 (495) 260-13-21

E-mail: mediavetservis@mail.ru

Сайт: http://medvs.ru

2019

БИОКОКС 2,5%

ПРОТИВОЭЙМЕРИОЗНОЕ СРЕДСТВО



БИОКОКС 2,5%

ПРОТИВОЭЙМЕРИОЗНОЕ СРЕДСТВО

ОПИСАНИЕ

Противоэймериозное средство на основе толтразурила. Представляет собой от бесцветной до желтого цвета жидкость без запаха.

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 25 мг толтразурила.

Срок годности 3 года

Препарат хранят в закрытых темных сухих помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 25 °С.

[!] ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Биококс противоэймериозный препарат для лечения и профилактики эймериоза у сельскохозяйственных птиц. Толтразурил, входящий в состав лекарственного препарата, является производным триазинтриона, обладает широким спектром противоэймериозного действия, эффективен в отношении всех видов паразитирующих у птиц эймерий на стадиях внутриклеточного развития паразитов, включая E. acervulina, E. brunetti, E. necatrix, E. tenella, E. mitis, E. praecox, E.adenoides, E. meleagrimitis, E. anceris, E.truncata, в том числе устойчивых к другим противоэймериозным препаратам.



ПРИМЕНЕНИЕ

Биококс применяется для лечения и профилактики эймериоза бройлеров, ремонтного молодняка кур, индеек, гусей и уток.

Дозы и способ применения.

Препарат назначают птице при достижении критического уровня содержания эймерий в подстилке (10 - 20 тыс/г), а также при появлении клинических признаков заболевания.

Препарат применяют с питьевой водой два дня подряд в дозе 7 мг действующего вещества (толтразурила) на 1 кг массы птицы, что эквивалентно 1 мл 2,5 % раствора препарата на 1 л питьевой воды, которую выпаивают в течение 48 часов, или 3 мл 2,5 % раствора препарата на 1 л питьевой воды, которую выпаивают птице по 8 часов 2 дня подряд

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При использовании препарата в рекомендуемых дозах, побочные явления и осложнения не наблюдаются.

Запрещается использование препарата курам-несушкам!

СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой птицы на мясо разрешается через 8 дней после последнего применения препарата.

В случае вынужденного убоя ранее установленного срока мясо скармливают непродуктивным животным или утилизируют, в зависимости от вывода врача ветеринарной медицины