



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

8 (495) 211-99-91

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел
продаж 8 (495) 260-13-21

E-mail: mediavetservis@mail.ru

Сайт: <http://medvs.ru>



ЦЕБАКТАЛ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ



ЦЕБАКТАЛ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

① ОПИСАНИЕ

Антибактериальный препарат широкого спектра действия. По внешнему виду препарат представляет собой непрозрачную жидкость светло-жёлтого цвета.

📅 Срок годности 2 года


Препарат хранят в транспортной таре, в крытых складских помещениях, в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2°C до 30 °C. Срок хранения после первого открытия флакона - 28 суток.

✖ СОСТАВ

1 мл препарата содержит действующее вещество цефкином (в перерасчете на цефкинома сульфат) - 25 мг.

Вспомогательные вещества:

- масло рапсовое,
- пропилпарагидроксибензоат,
- метилпарагидроксибензоат.



㉑ ПРИМЕНЕНИЕ

КРС - лечение животных, больных следующими заболеваниями: панариций, язва копытной подошвы, гнойный пододерматит, септицемия, межпальцевый некробациллэз, некробактериоз, острый мастит, в т.ч. вызванный *Escherichia coli*, эшерихиоз (колибактериоз), респираторные заболевания, вызванные *Pasteurella multocida*, *Pasteur el la haemolitica* и другими микроорганизмами, чувствительными к цефкину;

Свиньи – лечение животных, больных следующими заболеваниями: респираторные заболевания, вызванные *Pctsteurella multocida*, *Haemophilus paai asuis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus suis* и другими микроорганизмами, чувствительными к цефкину, синдром MMA (мастит-метрит-агалактия), менингит, артрит, дерматит и другие заболевания бактериальной этиологии, обусловленные микрофлорой, чувствительной к цефкину.

Препарат вводят глубоко внутримышечно 1 раз в сутки на протяжении 2-5 суток.

🚫 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять животным, чувствительным к препарату, а также к другим β-лактамным антибиотикам. Не применять одновременно с бактериостатическими препаратами.

🗓 СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается через 8 суток, свиней - через 4 суток после последнего применения препарата. Молоко коров не разрешается использовать в пищу в период лечения препаратом, а также на протяжении 3 суток после последнего применения препарата.

Такое молоко может быть использовано в корм непродуктивным животным после термической обработки. Полученное до указанных сроков мясо утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зависимости от вывода врача ветеринарной медицины.