



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

8 (495) 211-99-91

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж **8 (495) 260-13-21**

E-mail: mediavetservis@mail.ru

Сайт: <http://medvs.ru>



2019

ЭНРОЦИН 10% И 20%
АНТИМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО



ЭНРОЦИН 10% И 20%

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

ОПИСАНИЕ

Антибактериальное средство на основе энрофлоксацина. Представляет собой порошок от белого с желтоватым оттенком до светло-жёлтого цвета.

СОСТАВ

В 1,0 г содержится 100 мг или 200 мг, соответственно, энрофлоксацина.

Срок годности 2 года

Хранят с предосторожностью (по списку Б) в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5°C до 25°C.

ПРИМЕНЕНИЕ


Энроцин 10% и 20% применяется для лечения колибактериоза, сальмонеллёза, микоплазмоза, бронхопневмонии, энтеритов и других заболеваний животных и птиц, вызванных возбудителями, чувствительными к энрофлоксацину. Энроцин 10% назначают животным 1 раз в сутки в смеси с кормом в течение 3-5 дней, в дозе 25-50 мг на 1 кг живого веса (2,5-5,0 мг на 1 кг живого веса по ДВ). Птице препарат применяют в смеси с комбикормом в дозе 1 кг на 1 тонну. Свиньям – в дозе 0,75 кг на 1 тонну комбикорма. При сальмонеллёзе и в тяжёлых случаях заболевания, дозу увеличивают в 2 раза. Прудовой рыбе суточная доза задаётся групповым способом 1 кг на 1 тонну комбикорма в течение 3-5 дней. С профилактической целью задают половину лечебной дозы. Энроцин 20% назначают животным 1 раз в сутки в смеси с кормом в течение 3-5 дней, в дозе 12,5-25 мг на 1 кг живого веса (1,25-2,5 мг на 1 кг живого веса по ДВ). Птице препарат применяют в смеси с комбикормом в дозе 0,5 кг на 1 тонну. Свиньям – в дозе 0,375 кг на 1 тонну комбикорма. При сальмонеллёзе и в тяжёлых случаях заболевания, дозу увеличивают в 2 раза. Прудовой рыбе суточная доза задаётся групповым способом 0,5 кг на 1 тонну комбикорма в течение 3-5 дней. С профилактической целью задают половину лечебной дозы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обладает широким спектром противомикробного действия. Активен в отношении:

- Pseudomonas aeruginosa,
- Klebsiella spp.,
- Escherichia coli,
- Enterobacter,
- Campylobacter,
- Shigella,
- Salmonella spp.,
- Aeromonas,
- Haemophilus,
- Proteus,
- Yersinia,
- Brucella
- spp.,
- Chlamydia trachomatis,
- Staphylococcus (включая пенициллиназо-продуцирующие и метициллиноустойчивые штаммы),
- Mycoplasma spp.

Энрофлоксацин – противомикробное синтетическое средство из группы фторхинолонов.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп макролидов, тетрациклина, хлорамфеникола, нитрофуранами, НПВС, теофиллином.

Не назначают препарат животным с повышенной чувствительностью к энрофлоксацину.

Не назначают курам-несушкам.

СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток, а птицы через 12 суток после последнего применения. Реализация товарной рыбы разрешается не ранее, чем через 10 дней после последнего применения препарата.