



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

8 (495) 211-99-91

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж **8 (495) 260-13-21**

E-mail: mediavetservis@mail.ru

Сайт: <http://medvs.ru>



2019

ФЕРТИЛИФИЛ С

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ



ФЕРТИЛИФИЛ С

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

ОПИСАНИЕ

Препарат представляет собой порошок от белого до светло-желтого цвета, выпускают в стеклянных флаконах вместимостью 10 см или 100 см по одной дозе (1,7 г).

СОСТАВ

В одной дозе препарата содержится: линкомицина гидрохлорида 210 мг, спектиномицина 265000 МЕ, неомицина 138000 МЕ, гентамицина 206000 МЕ, стрептомицина 226000 МЕ и бензилпенициллина натрия 300000 ЕД.

Срок годности 2 года

Хранят с предосторожностью (по списку Б) в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2°C до 25°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат применяют для лечения и профилактики синдрома «вагинальных истечений», эндометрита и повышения репродуктивных качеств свиноматок с тяжелыми затяжными родами или повторяющимися половую охоту, также для включения в разбавитель спермы хряков в качестве антимикробных веществ. После тяжелых затяжных родов и проявления синдрома «вагинальных истечений» или «метрит-мастит-агалактия» в первые 1-2 дня послеродового периода вводится в матку свиноматки одна доза препарата в форме раствора. Для этого, в асептических условиях, препарат растворяют в 80–100 мл воды для инъекций подогретой до 40–45 °С, внесенной в стерильный флакон прибора для осеменения свиней типа ПОС 5. Затем в половые пути свиноматки вводится стерильный катетер прибора так, чтобы головка катетера прошла несколько складок в шейке матки, после чего заполненный флакон прибора присоединяется к катетеру и раствор препарата вводится в матку в течение 3–4 мин. При сохранении признаков эндометрита и обильных вагинальных истечений введение препарата повторяют через 24 ч.


При выявлении у свиноматок, повторивших половую охоту, обильных вагинальных истечений (синдром «вагинальных истечений») за 4–6 ч до осеменения в матку вводится 0,5 дозы препарата в 40–50 мл воды для инъекций. Если животное осеменяют двукратно в течение половой охоты, то применение препарата необходимо провести перед первым осеменением. При включении препарата в разбавитель спермы хряков в качестве антимикробных веществ на 1 л свежеприготовленного разбавителя, в асептических условиях, вносят одну дозу препарата и тщательно размешивают на магнитной мешалке или другим способом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Побочных явлений и осложнений при применении препарата не наблюдалось.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комбинированный антибактериальный препарат на основе линкомицина, спектиномицина, тилозина и гентамицина. Обладает мощным санирующим эффектом, антибактериальным действием широкого спектра. Комбинация антибиотических веществ в фертилифиле С инициирует их синергидное антимикробное действие в отношении многих грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli*, *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus chromogenes*, *Staph. hyicus*, *Staph. epidermidis*, *Staph. warneri*, *Staph. saprophyticus*, *Proteus mirabilis*, *Citrobacter freundii*, *Pasteurella aerogenes*, *Budvicia aquatic*, *Kocuria kristinae*, *Str. Suis* и др., которые наиболее часто выявляются в матке свиноматок и сперме хряков; действует препарат и на микоплазм.



СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Мясо от свиноматок, которым применен препарат внутриматочно, или которых осеменяли спермой с включенным в разбавитель препаратом, используется без ограничений.