



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

**8 (495) 211-99-91**

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж **8 (495) 260-13-21**

E-mail: [mediavetservis@mail.ru](mailto:mediavetservis@mail.ru)


Сайт: <http://medvs.ru>



2019

**ФЕРТИЛИФИЛ К**

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ



# ФЕРТИЛИФИЛ К

## АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

### ❶ ОПИСАНИЕ

Препарат представляет собой порошок от белого до светло-желтого цвета, выпускают в стеклянных флаконах вместимостью 10 см или 100 см по одной (0,375 г) или четыре дозы (1,5 г).

### 🧪 СОСТАВ

В одной дозе содержится: линкомицина гидрохлорида 75 мг, спектиномицина 95 000 МЕ, тилозина 20 000 МЕ и гентамицина 73 000 МЕ.

### 📅 Срок годности 2 года

Хранят с предосторожностью (по списку Б) в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2°C до 25°C.

### 📖 ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат применяют для лечения и профилактики субклинического эндометрита и повышения оплодотворяемости коров с синдромом повторения половой охоты (отсутствие оплодотворения после трех осеменений), в анамнезе которых имелись болезни метритного комплекса, а также для включения в разбавитель спермы быков в качестве антимикробных веществ.

При повторении половой охоты после второго или более неоплодотворенного осеменения и выявлении признаков, указывающих на субклинический эндометрит (наличие в цервикальной слизи пузырьков воздуха, мелких беловатых хлопьев или более 5 0/0 нейтрофилов среди клеточных элементов и др.), препарат растворяют в воде для инъекций подогретой до 40–45 °С, соблюдая правила асептики, из расчета 20 мл на 1 дозу препарата, и с помощью пипетки для осеменения вводят в матку коровы до осеменения. Осеменяют животное не ранее 15–60 мин после введения препарата. Если животное осеменяют двукратно в течение половой охоты, то применение препарата необходимо провести перед первым осеменением.

При включении препарата в разбавитель спермы быков в качестве антимикробных веществ на 1 л свежеприготовленного разбавителя в асептических условиях вносят 4 дозы препарата и тщательно размешивают на магнитной мешалке или другим способом.

### ⊘ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Побочных явлений, осложнений и аллергических реакций при применении препарата не наблюдалось. В случае возникновения аллергических реакций препарат отменить, назначить антигистаминные препараты и препараты кальция.

### ⚠️ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комбинированный антибактериальный препарат на основе линкомицина, спектиномицина, тилозина и гентамицина. Обладает мощным saniрующим эффектом, антибактериальным действием широкого спектра. Препарат относится к антимикробным веществам для разбавителей спермы быков и внутриматочным противозндометритным лекарственным средствам, обладает высокой активностью против грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе *Escherihia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Staph. saprophyticus*, *Proteus spp.*, *Str. faecalis*, *Str. vaginitis* и др., которые наиболее часто выявляются в матке коров с синдромом повторения половой охоты. Действует препарат и на микоплазм.



### 🕒 СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Молоко от коров, которым применен препарат, используется без ограничений. Убой животных на мясо разрешается через 2 дня после применения препарата.