

ФЛОРФЕНВЕТ 30%

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ


ОПИСАНИЕ

Противомикробный препарат, представляющий собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-жёлтого цвета.

СОСТАВ

В 1 см³ препарата содержится 300 мг флорфеникола.

Срок годности 2 года



ПРИМЕНЕНИЕ

Флорфенвет 30% применяют:

- для лечения крупного и мелкого рогатого скота при заболеваниях органов дыхания, интердигитального некробактериоза, кератоконъюнктивита бактериальной этиологии;
- для лечения свиней при заболеваниях органов дыхания и других заболеваниях, вызванных чувствительными к флорфениколу возбудителями.

Крупному рогатому скоту препарат вводят внутримышечно в область шеи, в дозе 1 мл на 15 кг массы тела животного, но не более 10 см³ в одно место, 2 раза с интервалом 48 ч.

Мелкому рогатому скоту препарат вводят внутримышечно в область шеи, в дозе 1 мл на 15 кг массы тела животного, но не более 10 мл в одно место, 2 раза с интервалом 48 ч. Свиньям препарат вводят внутримышечно в область шеи, в дозе 1 мл на 20 кг массы тела животного, но не более 10 мл в одно место 2 раза с интервалом 48 ч.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять в период беременности и лактации, взрослым быкам-производителям и хрякам-производителям в период случки. Препарат не следует применять с хлорамфениколом и тиамфениколом. Не смешивать с другими препаратами.

Запрещен к применению на территории Республики Беларусь для продуктивных животных (для коров, овец и коз в период лактации), от которых молоко используется в пищу людям.

Побочные действия: при повышенной чувствительности к флорфениколу. Возможно снижение аппетита, понос, покраснение и отек в месте инъекции.

СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой животных на мясо допускается не ранее, чем через 30 дней после последнего применения препарата для крупного и мелкого рогатого скота и 14 дней после последнего применения препарата для свиней.