



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

**8 (495) 211-99-91**

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж **8 (495) 260-13-21**

E-mail: [mediavetservis@mail.ru](mailto:mediavetservis@mail.ru)


Сайт: <http://medvs.ru>



2019

**ГЕНТАМИЛ 10%**

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО



# ГЕНТАМИЛ 10%

## АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

### ОПИСАНИЕ

Препарат представляет собой порошок белого или с желтоватым оттенком цвета, легкорастворимый в воде.

### СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 100 мг гентамицина (в форме сульфата) и наполнитель.

### Срок годности 2 года

Хранят по списку Б в упаковке изготовителя при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом защищенном от прямого солнечного света месте.

### ПРИМЕНЕНИЕ


Гентамил 10% применяют при желудочно-кишечных заболеваниях, вызванных чувствительными к антибиотику микроорганизмами у свиней, телят и птицы. Препарат применяют внутрь индивидуально или групповым методом с кормами или водой в следующих дозах:

- Телята - в первый день гентамил 10% применяют в дозе 0,5 г препарата на 10 кг массы тела в два приема с интервалом 12 ч; в последующие 2-4 дня в дозе 0,4 г препарата на 10 кг массы тела один раз в сутки
- Птица - выпаивают с водой из расчета 5 г препарата на 100 л воды в течение 5 – 7 дней.
- Поросята - препарат при колибактериозе выпаивают с водой в дозе 11,0 г препарата на 100 л воды в течение 3 дней, при сальмонеллезе – 15 г препарата на 100 л воды в течение 4 дней, при кампилобактериозе и дизентерии 22 г препарата на 100 л воды в течение 5 дней. При приеме с кормом препарат задают в дозе 0,25 г на 10 кг массы тела, 2 раза в сутки в течение 3-5 дней.

Лечебный раствор следует готовить непосредственно в день применения.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гентамицина сульфат – антибиотик из группы аминогликозидов, обладающий широким спектром противомикробного действия. Гентамицин активен в отношении большинства грамотрицательных (*Escherichia coli*, *Enterobacter* spp., *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella* spp., *Campylobacter* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus* spp., *Treponema hyodysenteriae*) и грамположительных микроорганизмов (*Corynebacterium* spp., *Staphylococcus aureus*, *Bacillus* spp., *Listeria monocytogenes*). Антибиотик не действует на анаэробные бактерии, грибы, вирусы и на простейших.



### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При применении препарата возможны ототоксический и нефротоксический эффекты, аллергия. При возникновении аллергических реакций и других осложнений применение препарата следует прекратить и назначить антигистаминные препараты и препараты кальция.

Не допускается одновременное или последовательное применение гентамицина с другими ото- и нефротоксичными препаратами (стрептомицином, канамицином, неомицином и др.).

Запрещается применение препарата при тяжелых нарушениях функции почек; телятам старше трехмесячного возраста и птицам, яйца которых предназначены для пищевых целей.

### СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой животных на мясо разрешается через 30 суток, а птицы через 25 суток после последнего применения препарата. Мясо животных и птицы, вынужденно убитых ранее указанного срока, используют на корм плотоядным животным.