



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

8 (495) 211-99-91

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж **8 (495) 260-13-21**

E-mail: mediavetservis@mail.ru


Сайт: <http://medvs.ru>



2019

ГИСТЕРОСАН МК

ПРОТИВОЭНДОМЕТРИТНЫЙ ПРЕПАРАТ



ГИСТЕРОСАН МК

ПРОТИВОЭНДОМЕТРИТНЫЙ ПРЕПАРАТ

i ОПИСАНИЕ

Препарат на основе сульфадимидина, стрептоцида, норфлоксацина и витаминов В1 и С. Представляет собой порошок от белого до желтого цвета.

СОСТАВ

В 1 г препарата содержится действующих веществ: 310 мг сульфадимидина, 103 мг стрептоцида, 27 мг норфлоксацина, 20 мг витамина В1, 20 мг кислоты аскорбиновой и вспомогательных веществ: натрия тетрабората 345 мг, натрия цитрата 175 мг.

📅 Срок годности 2 года

Хранят по списку Б в упаковке изготовителя при температуре от +2 °С до +25 °С в сухом защищенном от прямого солнечного света месте.

📖 ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат применяют для лечения коров с задержанием последа и острым послеродовым метритом. При задержании последа через 8 – 24 ч после рождения плода вводится приготовленный раствор препарата. Для этого порошковая смесь растворяется при тщательном перемешивании в 1 л дистиллированной (или очищенной или кипяченной) воды, нагретой до температуры (60 – 70)С в стеклянной (или эмалированной) посуде. Раствор охлаждается до температуры (37 – 38)С и процеживается через ватно – марлевый тампон в стерильную стеклянную посуду. Приготовленное лекарственное средство вводится в матку между хорионом и эндометрием при помощи маточного ирригатора в количестве 0,7 л в беременный рог и 0,3 л в небеременный рог однократно.

До и после введения препарата наружные половые органы и свисающую часть оболочек обрабатывают дезинфицирующим раствором. Через сутки животное исследуют, и если послед не отделился, слегка потягивают за свисающую часть; если послед отделяется, его извлекают полностью. Если послед не отделяется в течение 2–3-х дней, то следует попытаться извлечь его при массаже матки через прямую кишку и только при неудаче использовать мануальное отделение.

При появлении клинических признаков катарально - гнойного эндометрита лечение необходимо продолжить путем внутриматочного введения antimicrobial средств в форме эмульсий, суспензий или раствора.

⊘ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Побочных явлений и осложнений при применении препарата не наблюдается.

⚠️ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обладает высокой активностью против грамположительных и грамотрицательных микробов, вульгарного протей, плесневых грибов.

При введении коровам с задержанием последа в матку между хорионом и эндометрием предупреждает гниение оболочек и развитие воспалительного процесса, усиливает сократительную функцию матки, способствует выведению оболочек из матки после разрушения связывающего их с эндометрием белкового слоя.

