

Инструкция по применению Ихтиола 100

1 Общие сведения

1.1 Ихтиол 100 (Ichthyolum 100).

1.2 Ихтиол 100 представляет собой тягучую, однородную массу, темно-бурого цвета, с запахом ихтиола, содержащую не менее 10% органически связанной серы.

1.3 Препарат выпускают полимерной таре по 0,1; 0,2; 0,5; 0,8 и 1,0 кг.

1.4 Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0°C до +25°C.

1.5 Срок годности 5 лет со дня изготовления.

2 Фармакологические свойства

2.1 Действует антисептически, противопаразитарно, противовоспалительно, кератопластически и местнообезболивающе. Противомикробное и противопаразитарное действие объясняется содержанием серы и ароматических веществ. После нанесения на раны и слизистые оболочки, помимо антисептического влияния, суживает сосуды, уменьшает секрецию и экссудацию, умеряет боль и ускоряет регенерацию пораженной ткани.

2.2 При приеме внутрь оказывает антисептическое и противобродильное действие.

2.3 Препарат относится к 2 классу опасности.

3 Порядок применения

3.1 Назначают наружно при различных поражениях кожи (раны, экземы, ожоги, дерматиты, фурункулез, пиодермии), подкожной клетчатки и мышц, артритах, невралгиях, тендинитах, тендовагинитах, бурситах, маститах, микроспории и чесотке. Используют в виде мази (10-20%), линимента и пасты (5-10%) При добавлении дегтя, серы и креолина лечебный эффект при чесотке и дерматомикозах усиливается.

3.2 В качестве антисептического и противобродильного средства применяют внутрь при острой тимпании рубца, метеоризме, функциональном расстройстве кишечника, воспалении желудка и кишечника, остром расширении кишок (колики). Дозы внутрь: лошадям 10-30г; крупному рогатому скоту 10-20г; мелкому рогатому скоту и свиньям 1-5г.

3.3 В акушерской практике используют при вагинитах в виде 3-5% растворов спринцеванием.

3.4 Для лечения телязиоза крупного рогатого скота используют 3-5%-ный раствор препарата путем промывания.

3.5 Препарат несовместим в растворах с алколоидами, солями тяжелых металлов, солями йода, аммиака, гликозидов.

3.6 После наружного применения препарата животноводческую продукцию используют без ограничений, а после внутреннего – через 2 дня после последнего применения препарата.

4 Меры личной профилактики.

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности, а также использовать средства индивидуальной защиты (перчатки).

4.2 Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу.

5 Порядок предъявления рекламаций.




5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 Полное наименование изготовителя.

6.1 Частное производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных препаратов»

Инструкция подготовлена доцентом кафедры акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения животных имени Я. Г. Губаревича УО ВГАВМ А.А. Гарбузовым, доцентом кафедры нормальной и патологической физиологии животных УО ВГАВМ Е.А. Юшковским.

Ветбиофармсовет при Департаменте ветеринарного и продовольственного контроля МСХ и П РБ	
ОДОБРЕНО	
Председатель	
Секретарь	
Эксперт	
«17» 09 2012 г.	протокол № 62