МВС

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

8 (495) 211-99-91

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж 8 (495) 260-13-21

E-mail: mediavetservis@mail.ru

Сайт: http://medvs.ru

2019

КОЛИСТИН КМ 1200

АНТИМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО

КОЛИСТИН КМ 1200

АНТИМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО

ОПИСАНИЕ

Колистин КМ 1200 - противомикробный препарат, представляющий собой водорастворимый порошок от белого до кремового цвета.

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 1200000 МЕ колистина сульфата и наполнитель (глюкоза, декстроза моногидрат или лактоза).

Срок годности 2 года

Хранят с предосторожностью (по списку Б) в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0°С до 25°С.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Колистина сульфат — смесь сульфатных полипептидов, продуцируемых некоторыми штаммами Bacillus polymyxia. Обладает бактерицидным действием в отношении большинства аэробных грамотрицательных микроорганизмов (в том числе Enterobacter, Escherichia coli, klebsiella spp., Salmonella spp., Pasteurella spp., Bordetella spp., Proteus spp. и некоторых других). Колистина сульфат нарушает проницаемость цитоплазматической мембраны, блокируя ее фосфолипидные компоненты, что ведет к выходу в окружающую среду водорастворимых соединений цитоплазмы.



ПРИМЕНЕНИЕ

Колистин КМ 1200 применяют свиньям, крупному рогатому скоту и птице при гастроэнтероколитах бактериальной этиологии (сальмонеллез, клебсиеллез, колибактериоз и др.).

Колистин КМ 1200 применяют с кормом или водой в следующих дозах:

- телятам: 0,25-0,4 г на 10 кг массы тела животного два раза в сутки в течение 3 - 5 дней;
- свиньям: 0,25-0,4 г на 10 кг массы тела животного два раза в сутки в течение 3 - 5 дней или 1 кг на 1000 — 2000 л питьевой воды или 500 — 2000 кг корма в течение 3 - 5 дней;
- птице: 1 кг на 1000 — 2000 л питьевой воды или 500 — 2000 кг корма в течение 3 - 5 дней. Раствор готовят из расчета потребности птицы в воде на сутки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При длительном использовании препарата возможно развитие дисбактериоза и суперинфекции. В редких случаях при применении препарата возможны аллергические реакции, а у животных с нарушениями выделительной функции почек — нефро- и нейро токсические реакции. При наличии побочных эффектов препарат следует отменить, назначить антигис таминные препараты и/или симптоматические средства. Запрещается применять препарат «Колистин КМ 1200» животным с повышенной чувствительностью к полипептидам, а также животным с патологией почек, жвачным животным с развитым рубцовым пищеварением. Не рекомендуется применять препарат с аминогликозидными антибиотиками, ампициллином, цефалоспоринами.

СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 7 суток после последнего применения препарата. Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям. Яйцо используют в пищевых целях без ограничений.