



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

8 (495) 211-99-91

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж **8 (495) 260-13-21**

E-mail: mediavetservis@mail.ru

Сайт: <http://medvs.ru>



2019

МЕТРАМАСТ ФОРТЭ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОТИВОМАСТИТНЫЙ ПРЕПАРАТ



МЕТРАМАСТ ФОРТЭ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОТИВОМАСТИТНЫЙ ПРЕПАРАТ

ОПИСАНИЕ

Препарат представляет собой однородную гелеобразную массу от светло-желтого до светло-коричневого цвета.

СОСТАВ

1 шприц содержит: окситетрациклина - 200 мг; бацитрацина - 2000 ЕД; неомицина - 250 мг; преднизолона - 10 мг; основы - до 8 г.

Срок годности 2 года

Препарат хранят (по списку Б) в сухом, защищенном от света месте, при температуре от плюс 2°C до плюс 25°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат предназначен для лечения коров, больных маститом в лактационный период. Для лечения мастита у коров.

Перед введением препарата содержимое больной четверти вымени выдаивается, сосок вымени обрабатывается антисептиками, разрешенными для этой цели. Затем снимают колпачок с наконечника шприца - инъектора и вводят его в сосковый канал, выдавливая содержимое в пораженную долю вымени.

После этого наконечник извлекают, пережимают верхушку соска и проводят массаж доли вымени снизу - вверх. При необходимости повторить лечение через 24 часа. Контроль эффективности лечения маститов у коров проводят через 3 - 5 дней после последнего введения препарата быстрым маститным тестом, используя диагностический препарат и молочно - контрольную пластинку.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комбинация компонентов, входящих в состав препарата, обеспечивает широкий спектр антимикробного действия по отношению к основным возбудителям мастита (*E.coli*, *Strept.uberis*, *Staph.aureus*). Антибиотики действуют последовательно на разные стадии развития бактерии. Благодаря этому препарат сохраняет активность даже в отношении бактерий, резистентных к компонентам в отдельности. Кортикостероидный компонент преднизолон позволяет максимально снизить воспалительную реакцию и отечность тканей вымени, количество соматических клеток в молоке и быстро восстановить молочную продуктивность.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Побочное действие при использовании препарата не установлено. Не допускается применение препарата при индивидуальной повышенной чувствительности к окситетрациклину, бацитрацину, преднизолону и неомицину.

СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Молоко от коров из больных четвертей вымени, подвергающихся лечению и до истечения 3 суток после последнего введения препарата, запрещается использовать для пищевых и кормовых целей. Его направляют на утилизацию. Из здоровых четвертей - используют в корм животных после кипячения.

Мясо животных, убитых в период лечения, разрешается использовать не ранее, чем через 3 суток после последнего введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано на корм плотоядным.