



# ОКСИТЕТРАВЕТ 500

## АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

### ОПИСАНИЕ


Препарат представляет собой порошок желтого цвета, однородный по окраске, без посторонних примесей. В 1 г препарата содержится 0,5 г окситетрациклина гидрохлорида и наполнитель (глюкоза).

Высокоэффективен против грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, микоплазм, хламидий, риккетсий, эймерий, актиномицетов. Особую чувствительность к препарату проявляют колибактерии и сальмонеллы.

### Срок годности 2 года

### СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 0,5 г окситетрациклина гидрохлорида и наполнитель (глюкоза).



### ПРИМЕНЕНИЕ

Окситетравет 500 применяют молодняку крупного рогатого скота, свиньям и птице в качестве лечебно-профилактического средства при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококковой инфекции, риккетсиозе и пчелам при гнильцовых болезнях. Препарат назначают орально в смеси с кормом или водой в течение 3-5 дней. Молодняку крупного рогатого скота 0,02-0,04 г/кг, свиньям 0,03-0,06 г/кг, курам, индейкам и уткам 0,04-0,1 г/кг массы 2 раза в сутки до выздоровления. Птице можно применять с водой из расчета 25 г на 5 литров воды и выпаивать до выздоровления. Для лечения и профилактики гнильцовых болезней пчел препарат применяют весной до начала массового мёдосбора или летом после откачки товарного мёда. Перед лечением больные семьи перегоняют в чистые продезинфицированные ульи, производят замену маток на здоровых плодных.

### СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой птицы и свиней на мясо разрешается через 14 суток после последнего применения препарата.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. При применении препарата в повышенных дозах возможен дисбактериоз.

Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп пенициллина, полимиксина и препаратами, содержащими соединения кальция, алюминия и магния.

Не использовать для лечения животных с дистрофическими поражениями печени и при повышенной чувствительности к данной группе антибиотиков. Препарат не назначают курам-несушкам.

При возникновении аллергических реакций препарат отменить, назначить антигистаминные препараты и препараты кальция.