



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

8 (495) 211-99-91

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж **8 (495) 260-13-21**

E-mail: mediavetservis@mail.ru

Сайт: <http://medvs.ru>



2019

ПРОКСИФЕРОН

ПРОБИОТИЧЕСКАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА



ПРОКСИФЕРОН

ПРОБИОТИЧЕСКАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА

📄 ОПИСАНИЕ

По внешнему виду добавка представляет собой сыпучий порошок желто-коричневого цвета, со слабым специфическим запахом, без посторонних примесей и плесени.

🔗 СОСТАВ

Содержит белок куриного лейкоцитарного альфа-интерферона, общий титр сапрофитной микрофлоры (*Bacillus subtilis* Erwinia herbicola (*Pantoea agglomerans*)) не менее 1×10^9 КОЕ/г.

📅 Срок годности 9 месяцев

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C.

📖 ПРИМЕНЕНИЕ

Добавку применяют при патологии желудочно-кишечного тракта на фоне нарушения естественного микробиоценоза: дисбактериозах, диареях инфекционной этиологии, энтеритах, интоксикациях, для предупреждения различных стрессовых воздействий, стимуляции иммунитета, для повышения сохранности, снижения конверсии корма и увеличения привесов. Также добавку применяют для вылупившихся цыплят, у которых ещё не сформировалась натуральная микрофлора кишечника и увеличивается риск проникновения и развития патогенов, а также после применения антибиотиков.

Добавку применяют в следующих дозах (рекомендуется задавать групповым способом с питьевой водой):

- цыплятам 1-2 дневного возраста - 20 г на 1000 голов в сутки в течение первых 3-х дней жизни;
- курам-несушкам - с профилактической целью из расчета 100 г на 1000 голов, 1 раз в сутки курсом 7 дней. При необходимости через 10-20 дней курс повторяют. - после лечения антибиотиками и в период стресса 50 г на 1000 голов в течение 5-7 дней; - при смешивании с комбикормом 200 г на 1000 кг комбикорма.

📌 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По совокупности действия препарат обеспечивает:

- нормализацию биоценоза кишечника;
- подавление патогенной микрофлоры в кишечнике;
- антивирусную защиту организма;
- стимуляцию неспецифического иммунитета;
- повышение сохранности молодняка;
- стимулирует привесы - снижает конверсию корма.

⊘ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказания и побочные действия не установлены. В указанных дозах не влияет на живые вирусные вакцины.

Меры предупреждения: специальных мер для личной профилактики при работе с добавкой не предусматривается.

Побочных явлений и осложнений при применении добавки в рекомендуемых дозах не выявлено.

🏠 СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Использование продукции животноводства и убой на мясо после применения добавки разрешается без ограничений.

