



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

**8 (495) 211-99-91**

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж **8 (495) 260-13-21**


E-mail: [mediavetservis@mail.ru](mailto:mediavetservis@mail.ru)

Сайт: <http://medvs.ru>



**РАЗБАВИТЕЛЬ-АДЬЮВАНТ**

ДЛЯ ВАКЦИН ПРОТИВ ТРИХОФИТИИ КРС



# РАЗБАВИТЕЛЬ-АДЪЮВАНТ ДЛЯ ВАКЦИН ПРОТИВ ТРИХОФИТИИ КРС

## ❶ ОПИСАНИЕ

Разбавитель-адъювант представляет собой маслянистую прозрачную жидкость от зеленовато- желтого до коричневого цвета, допускается опалесценция.

## 🧬 СОСТАВ

В разбавителе-адъюванте содержится рекомбинантный цитокин КРС II-го типа (иммунный бычий гамма интерферон) с активностью не менее  $1,0 \times 10^4$  МЕ/см<sup>3</sup>, определенной по антивирусному действию, вспомогательные вещества стабилизаторы белковой фракции, масляная неионогенная основа.

## 📅 Срок годности 18 месяцев

Разбавитель-адъювант хранят в сухом защищенном от света месте, при температуре от плюс 20С до плюс 100С

## 📖 ПРИМЕНЕНИЕ

Стерильным шприцом с соблюдением правил асептики во флакон с вакциной вносят 5 см<sup>3</sup> разбавителя-адъюванта и тщательно встряхивают до получения равномерной взвеси.

Полученную взвесь шприцом переносят во флакон со стерильным разбавителем-адъювантом из расчета 5 см<sup>3</sup> на одну дозу вакцины. Вакцину вводят внутримышечно в область крупа. Волосяной покров на месте инъекции предварительно выстригают и обрабатывают дезинфицирующим средством, разрешенным к применению. Шприц и иглы перед использованием стерилизуют кипячением. Вакцину используют в течение 3 ч после разбавления. Остатки неиспользованной разбавленной вакцины уничтожают кипячением в течение 30 мин. С профилактической целью вакцину, разбавленную разбавителем-адъювантом, применяют однократно в следующих дозах:

- телятам от 14 дней до 3-х месяцев – 5 см<sup>3</sup>;
- телятам старше 3-х месяцев и взрослым животным – 10 см<sup>3</sup>.

С лечебной целью вакцину, разбавленную разбавителем-адъювантом, вводят больным трихофитией животным двукратно с интервалом 12-14 суток в дозе 10 см<sup>3</sup>.

## ⊘ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

Разбавитель-адъювант безвреден и ареактогенен

## ⚠️ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комбинированный разбавитель для сухих вакцин с содержанием рекомбинантного цитокина КРС II-го типа (иммунный бычий гамма интерферон).

Разбавитель-адъювант двойного пролонгированного и функционального способа действия. Стимулирует реакции презентации антигена, формирование иммунной памяти и проявляет высокоэффективные адъювантные свойства при формировании иммунных реакций. Снимает поствакцинальный синдром.

Разбавитель-адъювант безвреден и ареактогенен.

