

## Лактацил

Профилактика нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта в виде диарей различной этиологии у молодняка сельскохозяйственных животных, лечение крупного и мелкого рогатого скота при атонии и гипотонии преджелудков, а также для улучшения аппетита.

Состав: в 1,0 см препарата содержится 85 мг муравьиной кислоты, 60 мг молочной кислоты и 9 мг метилурацила

### ОБЛАДАЕТ:

- ✓ противомикробным,
- ✓ противовоспалительным,
- ✓ адаптогенным и иммуностимулирующим действием.

### А так же:

- ✓ ускоряет ферментацию корма
- ✓ предотвращает образование сгустков казеина у молодняка жвачных животных
- ✓ купирует и предупреждает желудочно-кишечные расстройства
- ✓ благоприятно влияет на процессы пищеварения в кишечнике, способствует улучшению аппетита

**Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через трое суток**

### УП «МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ»

212016, Республика Беларусь, г. Могилев, Шкловское шоссе, 23  
Тел./факс +375 (222) 24-30-64, 24-43-77  
e-mail: mzvp@rambler.ru



## Румитон

применяют при гипотонии и атонии рубца, острой и периодической тимпание у крупного рогатого скота, овец и коз, остром метеоризме кишечника у лошадей, а так же для улучшения аппетита

В 100 мл препарата содержится 5% молочной кислоты, 1% муравьиной кислоты и вспомогательные вещества (вода дистиллированная, пропиленгликоль, консервант, пеногаситель)

### Препарат обладает:

- ✓ руминаторным,
- ✓ противобродильным,
- ✓ антимикробным,
- ✓ адорбирующим действием.

### А так же:

- ✓ препятствует газообразованию,
- ✓ разрушает образовавшиеся в кормовых массах пузырьки газа,
- ✓ усиливает секрецию и перистальтику пищеварительного тракта,
- ✓ расслабляет тонус сфинктеров преджелудков,
- ✓ ускоряет ферментацию корма, что благоприятно влияет на процессы пищеварения и обеспечивает быстрое продвижение содержимого в кишечнике, улучшает аппетит у животных.



**Отсутствуют ограничения по использованию животноводческой продукции**