

# 40 СОЛИКОКС

## ПРОТИВОКОКЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ


### ОПИСАНИЕ

По внешнему виду Соликоккс представляет собой прозрачную вязкую жидкость.

 Срок годности 2 года

### СОСТАВ

Соликоккс в качестве действующего вещества в 1 мл содержит 2,5 мг диклазурила, а в качестве вспомогательных компонентов пропиленгликоль и полиэтиленоксид до 1 мл.



### ПРИМЕНЕНИЕ

Соликоккс применяют с лечебно-профилактической целью при кокцидиозе (эймериозе) у птиц и кроликов.

Соликоккс применяют путем выпаивания в дозе 0,4 мл на 1 кг массы тела в день. С питьевой водой на протяжении 2 суток (1 мг действующего вещества на 1 кг массы тела в день), что приблизительно соответствует 2 мл препарата на 1 литр воды. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление птиц в течение суток. Через дозатор (медикатор) препарат задают в нерастворенном виде или готовят маточный раствор в соотношении не менее 10 л воды на 1 л препарата (10 мл воды на 1 мл препарата).

В случае приготовления маточного раствора Соликоккс необходимо добавлять в воду (а не наоборот).

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены. Особенности действия при первом приеме препарата и при его отмене не выявлено. При применении Соликоккса в соответствии с инструкцией, побочных реакций и осложнений, как правило, не наблюдается.

### СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой птиц и кроликов на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего применения Соликоккса. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения установленного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.