



«Утверждаю»

Заместитель генерального директора
по научной работе ООО «АТ Биофарм»

Кузьмин А.А.

30 ноября 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Соликокса для лечения сельскохозяйственных птиц и кроликов при кокцидиозе

(разработчик ООО «АТ Биофарм», Украина)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование: Соликокс (Solicox).

Международное непатентованное наименование: диклазурил.

2. Лекарственная форма: раствор для орального применения.

Соликокс в качестве действующего вещества в 1 мл содержит 2,5 мг диклазурила, а в качестве вспомогательных компонентов пропиленгликоль и полиэтиленоксид до 1 мл. По внешнему виду Соликокс представляет собой прозрачную вязкую жидкость.

3. Соликокс выпускают расфасованным по 10 и 1000 мл в полимерные флаконы с закручивающимися полимерными пробками с контролем первого вскрытия. Каждый флакон снабжают инструкцией по применению.

4. Соликокс хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5⁰С до 25⁰С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года с даты производства. После вскрытия упаковки при условии хранения в герметично закрытой таре - не более 28 дней. Срок годности раствора после растворения в воде - 24 часа. Соликокс запрещается применять по истечении срока годности.

5. Соликокс хранят в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Соликокс относится к кокцидиостатическим и кокцидиоцидным препаратам. Кокцидиостатик диклазурил, который входит в состав препарата "Соликокс", относится к малотоксичным веществам. Он действует на все виды кокцидий у птиц (*E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. tenella*, *E. adenoides*, *E. gallopavonis*, *E. meleagridis*), кроликов (*E. flavescens*, *E. intestinalis*, *E. magna*, *E. perforans*, *E. stiedai*). Наиболее чувствительные к препарату неполовые стадии эндогенного цикла развития кокцидий. Диклазурил не вызывает отрицательных последствий даже при превышении рекомендованных доз в 25-50 раз. Препарат не обладает мутагенным, канцерогенным и тератогенным действием, его можно совмещать с любыми кормовыми добавками, антибиотиками, кокцидиостатиками. Препарат термостабильный, эффективный в очень малых дозах, не накапливается в органах и тканях животных.

После перорального применения Соликокса диклазурил плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте и действует в органах пищеварительного тракта. Соликокс по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

8. Соликокс применяют с лечебно-профилактической целью при кокцидиозе (эймериозе) у птиц и кроликов.

9. Соликокс применяют путем выпаивания в дозе 0,4 мл на 1 кг массы тела в день с питьевой водой на протяжении 2 суток (1 мг действующего вещества на 1 кг массы тела в день), что приблизительно соответствует 2 мл препарата на 1 литр воды. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление птицей в течение суток. Через дозатор (медикатор) препарат задают в нерастворенном виде или готовят маточный раствор в соотношении не менее 10 л воды на 1 л препарата (10 мл воды на 1 мл препарата). В случае приготовления маточного раствора Соликокс необходимо добавлять в воду (а не наоборот).

10. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

11. Особенности действия при первом приеме препарата и при его отмене не выявлено.

12. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата лечение необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках и схеме применения.

13. При применении Соликокса в соответствии с инструкцией, побочных реакций и осложнений, как правило, не наблюдается.

14. Убой птиц и кроликов на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего применения Соликокса. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения установленного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

IV. Меры личной профилактики

15. При работе с Соликоксом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для животных. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

16. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Соликоксом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

17. Упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей; ее утилизируют с бытовыми отходами.

18. Организация-производитель: ООО «АТ Биофарм»; Украина, 61057, г. Харьков, пер. Театральный, 5-1а.

Инструкция разработана ООО «АТ Биофарм» (Украина).

Регистрационное удостоверение выдано ООО «АТ Биофарм», Украина.

Зарегистрирован Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан 30 ноября 2012 г.

Номер регистрационного удостоверения: РК-ВП-4-2128-12.