

## **СПОРОВИТ (жидкий)**

### **I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Торговое название: Споровит (жидкий).
2. Лекарственная форма: супензия.  
Споровит (жидкий) содержит живые спорообразующие бактерии штамма *Bacillus subtilis* 12B.  
По внешнему виду Споровит (жидкий) представляет собой однородную супензию от бежевого до желтовато-коричневого цвета. При хранении образуется легко разбивающийся осадок.  
Препарат расфасован по 10, 100 и 450 см<sup>3</sup> в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.
3. Флаконы с препаратом упаковывают по 1 или 5 штук в картонные коробки. Каждую коробку снабжают инструкцией по применению.  
Срок годности – 2 года от даты выпуска. По истечении срока годности препарат к применению не пригоден.
4. Споровит (жидкий) хранят и транспортируют в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 °C до 25 °C. После вскрытия первичной упаковки препарат хранят при температуре от 2 °C до 8°C в течение 15 суток.
5. Лекарственный препарат следует хранить в местах, не доступных для детей.
6. Флаконы с препаратом без маркировки, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности, с наличием посторонних примесей, с измененным цветом содержимого, а также остатки препарата, не использованные в течение 15 суток после вскрытия первичной упаковки, подлежат выбраковке с последующей утилизацией с бытовыми отходами.

### **II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

7. Споровит (жидкий) содержит живые микроорганизмы штамма *Bacillus subtilis* 12B. Действие препарата обусловлено выделением бактериями антибиотикоподобных веществ широкого спектра действия, ингибирующих рост стрептококков, протея, кишечной и синегнойной палочки, патогенных грибов. Штамм *Bacillus subtilis* 12B продуцирует протеолитические ферменты и другие биологически активные вещества, способствующие улучшению обмена веществ, повышению неспецифического иммунитета и, как следствие, повышению сохранности животных.  
В 1 см<sup>3</sup> препарата содержится 1x10<sup>8</sup> КОЕ спорообразующих бактерий штамма *Bacillus subtilis* 12B.

### **III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ**

8. Споровит (жидкий) предназначен для профилактики и лечения дисбактериозов, бактериальных и вирусных инфекций различной этиологии и локализации, а также грибковых заболеваний (трихофитии, микроспории, кандидозов). Препарат

показан также для улучшения пищеварения и обмена веществ, увеличения веса, для восстановления микрофлоры после применения антибиотиков и антигельминтных средств.

Применяется для всех видов сельскохозяйственных животных, птиц и рыб, а также для собак, кошек и других домашних животных.

9. Противопоказаний к применению препарата не выявлено.
10. Споровит (жидкий) назначают индивидуально и групповым методом, внутрь перед едой или вместе с кормом или питьевой водой, предварительно взболтав.  
С целью профилактики в дозе – 1,0 см<sup>3</sup> на 10 кг веса животного (групповым методом – 1 л на тонну корма или 1 000 л воды для всех видов животных и птиц) 1 раз в сутки в течение 7 дней, а затем, при необходимости, 2 раза в неделю в течение 2-х месяцев.  
С лечебной целью препарат назначают в дозе 1,0 см<sup>3</sup> – 5,0 см<sup>3</sup> на 10 кг веса животного, для птиц (голубей, кур, гусей и др.) в дозе 0,2 – 0,3 мл на голову, для суточных птенцов – 0,2 мл на 100 голов (или из расчета 1 – 5 л на тонну корма, или 1 000 л воды) 2 раза в сутки в течение 10 дней.  
Аэрозольно Споровит (жидкий) применяют в промышленном животноводстве, рыбоводстве и птицеводстве в соответствии с технологиями выращивания разных видов животных по отдельным методикам для профилактики и лечения, повышения эффективности вакцинации животных и с целью дезинфекции.
11. Симптомы передозировки при применении Споровита (жидкого) не выявлены.
12. При первом приеме препарата или при его курсовом применении особенностей лекарственной реакции не выявлено.
13. Специальные меры при пропуске приема одной или нескольких доз препарата не предусмотрены. Курс лечения продолжают.
14. Побочных явлений и осложнений при применении препарата не установлено.
15. Не рекомендуется назначать Споровит (жидкий) одновременно с антибиотиками и сульфаниламидаами.
16. Продукты убоя животных после применения лекарственного препарата реализуют без ограничений и периода ожидания.

### **IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ**

17. При применении Споровита (жидкого) следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения.
18. Специальные меры предосторожности при работе с препаратом не требуются.
19. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы следует вымыть руки с мылом. При попадании на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды.
20. Адрес производителя: ООО «Экохимтех», 450029, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, тел. (347) 242-49-53; 242-49-15, E-mail: echohimtech@yandex.ru.