

48 СУБМАСТИН КРС

ЛЕЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ И СОХРАНЕНИЕ МОЛОКА

ОПИСАНИЕ

Субмастин-КРС представляет собой прозрачную маслянистую жидкость от зеленовато-жёлтого до коричневого цвета. В процессе хранения допускается опалесценция и выпадение осадка, ресуспендирующегося при встряхивании.

СОСТАВ

В 1,0 см³ препарата содержится: смесь видоспецифических для КРС рекомбинантных цитокинов суммарной активностью не менее 10⁴ ТЦД50/см³, витамин А-75000 МЕ, вспомогательные вещества и растворитель до 1,0 см³.

 Срок годности 18 месяцев



ПРИМЕНЕНИЕ

Субмастин КРС применяют коровам для профилактики и лечения субклинического мастита (с содержанием соматических клеток до 1,1 млн./мл молока); снижения содержания соматических клеток; комплексной терапии клинического мастита.

Для лечения субклинического мастита, снижения содержания соматических клеток в молоке у лактирующих коров биопрепарат вводят внутримышечно или подкожно в объеме 1,0 см³ на 50 кг массы животного 1 раз в день с интервалом 24 ч в течение 2-3-х дней, в зависимости от степени развития заболевания.

При лечении клинических маститов биопрепарат вводят дважды внутримышечно или подкожно в объеме 1,0 см³, на 50,0 кг массы животного 1 раз в день с интервалом 24 ч на начальном этапе комплексной терапии с антибактериальными противомаститными препаратами. Биопрепарат «Субмастин-КРС» совместим с любыми средствами антимаститной терапии.

Профилактику возникновения маститов у здоровых лактирующих коров осуществляют путем однократной инъекции внутримышечно или подкожно в объеме 1,0 см³, на 50,0 кг массы животного, повторяя курс через каждые 20 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний, побочных явлений и осложнений при использовании биопрепарата не установлено.

Применение биопрепарата не исключает использование средств патогенетической и симптоматической терапии.

СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой животных на мясо и использование мяса при вынужденном убое и молока в процессе и после применения биопрепарата без ограничений.