



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

8 (495) 211-99-91

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж **8 (495) 260-13-21**

E-mail: mediavetservis@mail.ru

Сайт: <http://medvs.ru>



2019

ТИАМ ОТЦ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО



ТИАМ ОТЦ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

ОПИСАНИЕ

Препарат представляет порошок от светло-желтого до желтого цвета.

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится: 0,025 г тиамулина гидрогенфумарата, 0,08 г окситетрациклина гидрохлорида и наполнитель до 1,0 г.

Срок годности 2 года

Хранят по списку Б в упаковке изготовителя при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом защищенном от прямого солнечного света месте.

ПРИМЕНЕНИЕ


С лечебной и профилактической целью препарат применяют при желудочно-кишечных и респираторных заболеваниях свиней бактериальной и микоплазменной этиологии, в т.ч. дизентерии, пролиферативной энтеропатии (илеита), энзоотической пневмонии, актинобацеллярной плевропневмонии и других бактериальных инфекций свиней, вызванных чувствительными к тиамулину и тетрациклинам микроорганизмами.

Применяют свиньям в смеси с кормом или водой, индивидуально или групповым методом из расчета 5 кг на 1 тонну корма или 24 г на 10 л воды, в течение 7-10 дней. Для обеспечения равномерного распределения лекарственного средства в корме, рассчитанную дозу препарата ступенчато смешивают последовательно с 10 кг, 100 кг и 900 кг комбикорма.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комбинация тиамулина гидрогенфумарата и окситетрациклина гидрохлорида, входящих в состав препарата, обладая синергидным действием, обеспечивает широкий спектр его антибактериальной активности в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Тиамулин гидрофумарат относится к полусинтетическим производным дитерпенового антибиотика плевромутилина, продуцируемого *Pleurotus mutulis*, обладает бактериостатической активностью. Подавляет синтез белка на рибосомальном уровне грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат запрещается применять супоросным свиноматкам (в течение первого месяца супоросности), лактирующим животным и племенным хрякам. Не рекомендуется его применять одновременно с молоком, препаратами кальция, магния, цинка, железа, меди, кобальта и марганца. Не допускается применение животным с выраженной почечной недостаточностью, совместно с ионоформными эймериостатиками, антибиотиками аминогликозидного ряда, а также в течение 7 дней до и 7 после их применения, ввиду возможного возникновения у животных побочных явлений и осложнений (диарея, анорексия, нефротоксические эффекты).

СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой свиней на мясо разрешается через 10 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, используют для кормления плотоядных.