



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

8 (495) 211-99-91

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж **8 (495) 260-13-21**

E-mail: mediavetservis@mail.ru


Сайт: <http://medvs.ru>



2019

ТИЛАМИЛ

АНТИМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО



ТИЛАМИЛ

АНТИМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО

ОПИСАНИЕ

Тиламил — противомикробный препарат, представляет собой порошок белого или белого с кремовым или желтоватым оттенком цвета, растворимый в воде.

СОСТАВ

В 1,0 г тиламила содержится 500000 МЕ тилозина тартрата и наполнитель.

Срок годности 2 года

Хранят с предосторожностью (по списку Б) в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5°C до 25°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Тиламил применяют для лечения и профилактики респираторного микроплазмоза у птицы, инфекционного синусита у индеек, дизентерии и гастроэнтероколитов бактериальной этиологии свиней, бронхопневмонии у телят, вызванной микроорганизмами, чувствительными к тилозину.

Тиламил применяют в следующих дозах:

- телята: 10 – 20 мг/кг массы животного 2 раза в сутки до выздоровления (5–10 дней), индивидуально, внутрь с кормом или водой;
- свиньи: 0,5-1,0 г на 1 л воды (10 мг/кг массы тела) в течение 3 – 5 дней индивидуально или групповым способом. С профилактической целью препарат применяют в дозе 5 – 10 мг/кг массы один раз в сутки в течение 7 – 10 дней.
- птица: 1,0 г на 1 л воды в течение 3 – 5 дней в зависимости от тяжести заболевания.

Перед применением рекомендованную дозу препарата растворяют в небольшом количестве воды (воду добавляют к порошку), а затем разводят водой до необходимого количества.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обладает спектром противомикробного действия.

Тилозина тартрат — антибиотик из группы макролидов. Активен в отношении большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов. Препарат оказывает действие на микоплазмы, хламидии, риккетсии, пастереллы, клостридии, стрептококки, стафилококки, трепонемы, балантидии и на некоторые другие микроорганизмы.

Механизм действия тилозина тартрата основан на ингибировании синтеза белка в микробной клетке, путем блокирования фермента транслоказы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В редких случаях у свиней после применения препарата возможны аллергические реакции, проявляющиеся в виде эритемы и зуда, которые проходят после отмены препарата.

Не рекомендуется одновременное применение с антибиотиками из групп пенициллина и цефалоспорины, и животным, имеющим индивидуальную чувствительность к макролидам.

СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой свиней и птицы на мясо, а также использование яиц для пищевых целей, разрешается не ранее чем через 5 суток после последнего применения препарата. Убой крупного рогатого скота разрешается через 14 суток после последнего назначения препарата.

Мясо животных, вынужденно убитых ранее указанного срока, используют на корм плотоядным животным.

