



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

**8 (495) 211-99-91**

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж **8 (495) 260-13-21**

E-mail: [mediavetservis@mail.ru](mailto:mediavetservis@mail.ru)


Сайт: <http://medvs.ru>



2019

**ТРИХОФИТ ПЛЮС**

ВАКЦИНА СУХАЯ ЖИВАЯ



# ТРИХОФИТ ПЛЮС

## ВАКЦИНА СУХАЯ ЖИВАЯ

### ОПИСАНИЕ

По внешнему виду препарат – однородная сухая масса в виде таблетки от светло-серого до кремового цвета.

### СОСТАВ

В 1 дозе вакцины содержится 30-250 млн. жизнеспособных микроконидий гриба *Trichophyton verrucosum*. Разбавитель-адъювант, которым комплектуется вакцина, двойного пролонгирующего и функционального способа действия в своем составе содержит рекомбинантный цитокин КРС II-го типа (иммунный гамма интерферон) с активностью не менее  $1,0 \times 10^4$  МЕ/см<sup>3</sup>.

### Срок годности 12 месяцев

Хранят в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2°C до 10°C.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для профилактики и лечения трихофитии у КРС. Перед применением вакцину суспендируют и разбавляют в разбавителе-адъюванте. Перед применением вакцину суспендируют и разбавляют в разбавителе-адъюванте. Для этого стерильным шприцом с соблюдением правил асептики во флакон с вакциной вносят 5 см<sup>3</sup> разбавителя-адъюванта и тщательно встряхивают до получения равномерной взвеси. Вакцину вводят внутримышечно в область крупа. Волосы на месте инъекции предварительно выстригают и обрабатывают дезинфицирующим средством, разрешенным к применению. Шприц и иглы перед использованием стерилизуют кипячением. Вакцину используют в течение 3 ч после разбавления. Остатки неиспользованной вакцины уничтожают кипячением в течение 30 мин. С профилактической целью разбавленную разбавителем-адъювантом вакцину применяют однократно в следующих дозах:

- телятам от 14 дней до 3-х месяцев – 5 см<sup>3</sup>,
- телятам старше 3-х месяцев и взрослым животным – 10 см<sup>3</sup>

С лечебной целью вакцину, разбавленную разбавителем-адъювантом, вводят больным трихофитией животным двукратно с интервалом 12-14 суток в дозе 10 см<sup>3</sup>

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вакцина представляет собой лиофильно высушенный живой аттенуированный штамм гриба *Trichophyton verrucosum*, выращенный на твердой и/или жидкой питательной среде.

Вакцина обладает профилактическими и лечебными свойствами. Вакцина в своем составе содержит фрагменты мицелия и микроконидии живого аттенуированного вакцинного штамма *Trichophyton verrucosum*, которые обеспечивают иммунитет против трихофитии. Рекомбинантный цитокин II-го типа.



### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Вакцинации не подлежат животные с повышенной температурой тела, с признаками истощения или каких-либо заболеваний, а также в последние сроки стельности.

Не допускается применение вакцины в хозяйствах, неблагополучных по острым инфекционным заболеваниям до ликвидации этих заболеваний.

### СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой вакцинированных животных разрешается через 10 суток после вакцинации. Молоко от привитых клинически здоровых животных используют без ограничений. При вынужденном убое животных в более ранние сроки продукты убоя используют в соответствии с правилами ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов. Перегруппировка, транспортировка вакцинированных животных разрешается без ограничений через месяц после последнего введения вакцины.