МВС

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

8 (495) 211-99-91

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж 8 (495) 260-13-21

E-mail: mediavetservis@mail.ru

Сайт: http://medvs.ru

2019



ЙОДОМАСТИН ПЛЮС

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОТИВОМАСТИТНЫЙ ПРЕПАРАТ

ЙОДОМАСТИН ПЛЮС

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОТИВОМАСТИТНЫЙ ПРЕПАРАТ

ОПИСАНИЕ

Йодомастин представляет собой вязкий раствор от темно-красного до темно-коричневого цвета с характерным запахом йода.

СОСТАВ

В состав препарата входит йодополимерный комплекс. Массовая доля активного йода составляет 0,1%

Срок годности 2 года

Препарат хранят (по списку Б) в сухом, защищенном от света месте, при температуре от плюс 5°С до плюс 25°С.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Йодомастин – противомаститный препарат. Входящий в состав препарата йод в виде йодополимерного комплекса обладает противомикробным, противогрибковым, противовоспалительным и вяжущим действием.

В основе противомикробного действия йода лежит способность нарушать обменные процессы возбудителей. Проникая в протоплазму клеток, йод взаимодействует с аминогруппами белков, подавляет жизненно важные ферментные системы. При взаимодействии йода с водой протоплазмы клеток образуется активный кислород, который оказывает сильное окисляющее действие. Этим объясняется также губительное действие йода на грибы.



ПРИМЕНЕНИЕ

Йодомастин применяют для лечения маститов у коров и коз. Препарат назначают животным по следующей схеме:

- Форма мастита - Серозный. Внутрицистернальное введение (t 35-37°С) козам - 2-5 мл , коровам - 5-10 мл. Ежедневно, 1 раз в сутки, 2-3 дня подряд.
- Форма мастита - Катаральный. Внутрицистернальное введение (t 35-37°С) козам - 2-5 мл , коровам - 5-10 мл. Один раз в сутки, 3-6 дней подряд.
- Форма мастита - Гнойный (гнойно-катаральный, абсцедирующий). Внутрицистернальное введение (t 35-37°С) козам - 2-5 мл , коровам - 10-20 мл. Два раза в сутки, 7-10 дней подряд.
- Форма мастита - Фибринозный. Внутрицистернальное введение (t 35-37°С) козам - 3-5 мл , коровам - 10-20 мл. Два раза в сутки, до полного выздоровления.
- Форма мастита - Субклинический (скрытый). Внутрицистернальное введение (t 35-37°С) козам - 2-5 мл ,

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В рекомендуемых дозах Йодомастин не вызывает побочных явлений. Препарат запрещается вводить животным с повышенной чувствительностью к йоду.

При возникновении аллергических реакций применение Йодомастина следует прекратить и назначить антигистаминные средства (димедрол, дипразин и др.) и препараты кальция (кальция хлорид, кальция глюконат, кальция борглюконат).

Применение препарата не исключает использование средств патогенетической и симптоматической терапии.

СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Ограничений по использованию животноводческой продукции нет.