



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

8 (495) 211-99-91

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж **8 (495) 260-13-21**

E-mail: mediavetservis@mail.ru


Сайт: <http://medvs.ru>



2019

ЙОДОМЕТРИН ПЛЮС

ПРОТИВОЭНДОМЕТРИТНЫЙ ПРЕПАРАТ



ЙОДОМЕТРИН ПЛЮС

ПРОТИВОЭНДОМЕТРИТНЫЙ ПРЕПАРАТ

ОПИСАНИЕ

Представляет собой вязкий раствор от темно-красного до темно-коричневого цвета, с характерным запахом йода.

СОСТАВ

В состав препарата входит йодополимерный комплекс. Массовая доля активного йода составляет 0,1%.

Срок годности 2 года

Препарат хранят (по списку Б) в сухом, защищенном от света месте, при температуре от плюс 5°C до плюс 25°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Йодометрин плюс вводят внутриматочно двукратно (в 1-й и 2-й день после отела) в следующих дозах:

- коровам, кобылам: 100,0 – 150,0 см³;
- козам, овцам: 50,0 – 80,0 см³.

При острых эндометритах препарат вводят внутриматочно в дозе 25-30 см³/100 кг массы тела животного один раз в сутки до клинического выздоровления.

При хронических эндометритах (внутриматочно) в дозе:

- коровам, кобылам – 50,0 см³;
- козам, овцам – 25,0 см³ один раз в сутки до выздоровления.

При субклиническом эндометрит (внутриматочно) в следующих дозах:

- коровам, кобылам: 15,0 – 20,0 см³;
- козам, овцам: 10,0 см³ через 12-24 часа после последнего осеменения.

Для санации матки у коров Йодометрин плюс вводят внутриматочно в дозе 20,0 – 25,0 см³. Перед введением Йодометрин плюс необходимо подогреть до температуры 37-38°C.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Йодометрин плюс обладает широким спектром действия, активен в отношении неспорообразующих микроорганизмов (исключая микобактерии), вирусов, грибов.

В основе противомикробного действия йода лежит способность нарушать обменные процессы возбудителей. Проникая в протоплазму клеток, йод взаимодействует с аминокруппами белков, подавляет жизненно важные ферментные системы. При взаимодействии йода с водой протоплазмы клеток образуется активный кислород, который оказывает сильное окисляющее действие. Этим объясняется также губительное действие йода на грибы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Применение Йодометрина плюс противопоказано при индивидуальной повышенной чувствительности к йоду.

Возможна индивидуальная непереносимость. В этом случае применение Йодометрина плюс следует прекратить.

СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Ограничений по использованию животноводческой продукции нет.

