



8 (495) 211-99-91

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел
продаж **8 (495) 260-13-21**

E-mail: mediavetservis@mail.ru

Сайт: <http://medvs.ru>



МАДУРО ФОРТЭ

ПРОТИВОКОКЦИДНЫЙ ПРЕПАРАТ



Произведено в Австрии.

МАДУРО ФОРТЭ

ПРОТИВОКОКЦИДНЫЙ ПРЕПАРАТ

ⓘ ОПИСАНИЕ

Мадуро Фортэ - комплексный двухкомпонентный кокцидиостатик-мадурамицин и диклазурил. Комбинированный кокцидиостатик для лечения и профилактики эймериозов птиц. По внешнему виду представляет собой порошок от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета.

ⓘ СОСТАВ

Мадуро форте в качестве действующего вещества содержит в 100 г: мадурамицин аммоний - 0,9 г, диклазурил - 0,2 г, в качестве вспомогательного вещества - пшеничную крупу грубого помола до 100 г.

ⓘ Срок годности 1 год

Хранить в сухом, темном, месте при температуре от 0 до 30 ° С, в заводской упаковке.

ⓘ ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется с лечебно-профилактической целью молодняку кур (цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур) и индюкам при кокцидиозе. Мадуро Фортэ применяют в смеси с кормом в дозе 500 г препарата на 1 тонну корма (0,5 г препарата на 1 кг корма).

Для равномерного распределения лекарственного препарата, суточную дозу смешивают с небольшим количеством корма (3-10% общего количества), а затем полученную смесь перемешивают с оставшимся кормом.

Неравномерное смешивание препарата с кормом, неравномерное поедание корма, содержащего препарат (голодные, больные животные), превышение рекомендованных концентраций в корме могут, в отдельных случаях, приводить к снижению продуктивности животных и даже к проявлению клинических признаков отравления

ⓘ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Обладает широким комбинированным кокцидиоидным и кокцидиостатичным действиями.
- Действует на эймерий на всех стадиях их развития.
- Не позволяет эймериям вырабатывать длительный период резистентность.
- Самый эффективный ввод в корма методом прямой противококцидийной программы, тем самым не требует дополнительных экономических затрат при производстве, хранении и доставке кормов.



ⓘ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует применять препарат птице с повышенной чувствительностью к мадурамицину и диклазурилу. Не применять одновременно с другими кокцидиостатиками. Запрещается применение препарата одновременно с препаратами, содержащими тиамулин, а также 7 суток до и 7 дней после применения тиамулина. При применении в соответствии с инструкцией, побочных реакций и осложнений, как правило, не наблюдается.

Запрещается применение Мадуро Фортэ курам-несушкам и ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста, индюкам старше 12-недельного возраста, в связи с его накоплением в яйцах.

ⓘ СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего применения. Мясо птицы, вынужденно убитой до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.