



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

**8 (495) 211-99-91**

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел  
продаж **8 (495) 260-13-21**

E-mail: mediavetservis@mail.ru

Сайт: <http://medvs.ru>



## САЛИМИКС ПЛЮС

ПРОТИВОКОКЦИДНЫЙ ПРЕПАРАТ



Произведено в Австрии.

# САЛИМИКС ПЛЮС

ПРОТИВОКОКЦИДНЫЙ ПРЕПАРАТ

## ① ОПИСАНИЕ

Салимикс Плюс - комплексный кокцидиостатик – салиномицин и диклазурил. Комбинированный кокцидиостатик для лечения и профилактики эймериозов животных и птиц. По внешнему виду представляет собой порошок от светло-серого до светло-жёлтого цвета.

## ● СОСТАВ

Салимикс плюс в качестве действующих веществ содержит в 100 г:

- салиномицина натрий - 11,0 г,
- диклазурила - 0,2 г,

В качестве вспомогательного вещества кальция карбонат до 100 г.

## 🕒 Срок годности 1 год

Хранить в сухом, темном месте при температуре от 0°C до +30°C, в заводской упаковке.

## ▣ ПРИМЕНЕНИЕ

Салимикс плюс применяется с лечебно-профилактической целью молодняку кур (цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур) до 12 недель, молодняку крупного рогатого скота и овец (телята и ягнята с развитыми преджелудками), свиньям при кокцидиозе. Салимикс плюс скармливают животным с кормом в течении всего периода откорма в следующих дозах:

- куры (цыплята-бройлеры, ремонтный молодняк кур) - 500 г препарата на 1 тонну корма (0,5 г препарата на 1 кг корма);
- свиньи до 4 месяцев - 250-500 г препарата на 1 тонну корма;
- свиньи от 4 до 6 месяцев - 250 г препарата на 1 тонну корма;
- молодняк крупного рогатого скота и овцы (от 3-х недель) - 84-250 г препарата на 1 тонну корма.

Для равномерного распределения лекарственного препарата суточную дозу смешивают с небольшим количеством корма (3-10% общего количества), а затем полученную смесь перемешивают с оставшимся кормом. Неравномерное смешивание препарата с кормом, неравномерное поедание корма, содержащего препарат (голодные, больные животные), превышение рекомендованных концентраций в корме могут, в отдельных случаях, приводить к снижению продуктивности животных и даже к проявлению клинических признаков отравления.

## (!) ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Обладает широким комбинированным кокцидицидным и кокцидиостатичным действиями.
- Действует на эймерий на всех стадиях их развития. Не позволяет эймериям вырабатывать длительный период резистентность.
- Самый эффективный ввод в корма методом прямой противококцидийной программы.
- Обладает антибактериальным эффектом к возбудителям анаэробной инфекции желудочно-кишечного тракта.



## 🚫 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение Салимикса плюс курам-несушкам в связи с его накоплением в яйцах, телятам и ягнятам с неразвитыми преджелудками, а также лошадям и другим непарнокопытным животным.

Не следует применять препарат животным с повышенной чувствительностью к салиномицину и диклазурилу. Не применять одновременно с другими кокцидиостатиками.

Запрещается применение препарата Салимикс плюс одновременно с препаратами, содержащими тиамулин, а также 7 суток до и 7 дней после применения тиамулина.

## ─ СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего применения Салимикс плюс. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм.