



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

**8 (495) 211-99-91**

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел  
продаж **8 (495) 260-13-21**

E-mail: [mediavetservis@mail.ru](mailto:mediavetservis@mail.ru)

Сайт: <http://medvs.ru>



## ТРИМИКОЗИН

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ



Произведено в Украине.

# ТРИМИКОЗИН

## АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

### ⓘ ОПИСАНИЕ

Тримикозин - Тилмикозин, Энрофлоксацин, Триметоприм. Комбинированный антибиотик для лечения ассоциированных бактериальных инфекций у птицы. По внешнему виду представляет собой прозрачный раствор жёлтого цвета.

### ⚗ СОСТАВ

В 1 мл содержит: 50 мг тилмикозина фосфата, 50 мг энрофлоксацина и 25 мг триметопrima. Вспомогательный компонент - вода дистиллированная до 1 мл.

### 📅 Срок годности 2 года

Хранят в упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +25°C. Хранят в местах, недоступных для детей.

### ⚛ ПРИМЕНЕНИЕ

Тримикозин применяют с лечебно-профилактической целью курам при:

- колибактериозе,
- сальмонеллезе,
- хронических респираторных заболеваниях,
- стрептококкозе,
- некротическом энтерите,
- гемофилезе,
- микоплазмозе,
- смешанных инфекциях и вторичных инфекциях при вирусных заболеваниях, возбудители которых чувствительны к тилмикозину, энрофлоксацину и триметоприму.

Тримикозин применяют путем выпаивания в суточной дозе 1-2 мл на 1 л питьевой воды на протяжении первых 3-х дней жизни. Обработку цыплят рекомендуется повторить на 20-22 сутки жизни путем выпойки препарата на протяжении 3 суток в дозе 1-2 мл на 1 л питьевой воды.

В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление птицей в течение суток. В случае приготовления маточного раствора Тримикозин необходимо добавлять в воду (а не наоборот).

### ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Увеличивает сохранность и минимизирует риск попадания бактерий в мясопродукцию.
- Действует при низкой чувствительности микрофлоры.
- Обладает широким спектром действия.
- Повышает активность макрофагов.
- Сохраняет терапевтическую концентрацию в организме на протяжении более 2-х суток после последнего применения.



### ❌ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение Тримикозина птице, чувствительной к компонентам препарата, а также курам-несушкам в связи с накоплением тилмикозина, энрофлоксацина и триметоприма в яйцах. Не применяют птице с нарушениями функции почек и/или печени.

Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата в терапевтических дозах не выявлены. Особеностей действия при первом приеме препарата и при его отмене не выявлено. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата лечение необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках и схеме применения.

При применении в соответствии с инструкцией, побочных реакций и осложнений, как правило, не наблюдается. Запрещается применение совместно с бактериостатическими антибиотиками (левомицетином, макролидами и тетрациклинами), теофиллином и нестероидными противовоспалительными средствами, препаратами магния и кальция.

### 📅 СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой птиц на мясо разрешается не ранее, чем через 12 суток после последнего применения. Мясо птиц, вынужденно убитых до истечения установленного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.