Рассмотрено и одобрено
Ветбиофармсоветом,
протокол № 61
от «24» января 2012 г.

Инструкция по применению препарата «Апрамицинвет-500»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Апрамицинвет-500 (Apramicinvet-500).

1.2 В 1 г препарата содержится 500 мг апрамицина (в форме апрамицина сульфата) и наполнитель.

1.3 Препарат представляет порошок от светло-желтого до светло-коричневого цвета, растворимый в воде.

1.4 Препарат выпускают по 0,2; 0,5; 1,0 и 5,0 кг в двойных пакетах из полиэтиленовой пленки, полимерных пакетах или непрозрачной полимерной таре.

1.5 Хранят с предосторожностью (список Б) в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5°С до плюс 25°С.

Срок годности препарата - 2 года от даты изготовления при соблюдении условий хранения.

2 . ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Апрамицинвет-500 оказывает бактерицидное действие преимущественно в отношении грамотрицательных, а также некоторых грамположительных бактерий, в т.ч. Escherichia coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Proteus spp., Bordetella bronchiseptica, Klebsiella spp., Campylobacter spp., Brachyspira hyodysenteriae и некоторых видов микоплазм (Mycoplasma hyopneumoniae). Препарат не влияет на анаэробов. Механизм антибактериального действия апрамицина обусловлен подавлением синтеза белка микроорганизмов путем необратимого связывания с 30S-субъединицей рибосом.

2.2 При пероральном введении Апрамицинвет - 500 слабо всасывается и достигает высокой антибактериальной концентрации в желудочно-кишечном тракте.

2.3 Апрамицин не подвергается биотрансформации в организме животных и после перорального введения выводится в неизмененном активном виде, преимущественно через желудочно-кишечный тракт и частично с мочой. Препарат относится к четвертому классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА.

3.1 Препарат применяют для лечения у сельскохозяйственных животных и птицы при желудочно-кишечных и респираторных заболеваний инфекционной этиологии, вызываемых преимущественно грамотрицательными микроорганизмами, чувствительными к апрамицину и резистентными к другим антибиотикам (сальмонеллез и эшерихиоз телят, свиней, цыплят и кур), а также при мастите у свиней (синдром мастит-метрит-агалактия).

3.2 Препарат назначают животным внутрь с водой или заменителем молока один раз в сутки в течение 5-7 дней в следующих дозах: поросятам 20 - 40 мг/кг массы тела, свиньям 15-25 мг/кг массы тела, телятам 40-80 мг/кг массы тела, птице и цыплятам 0,5-1,0 г на литр воды.

3.3 Побочное действие. Препарат может оказывать нефротоксическое и ототоксическое действие.

3.4 Противопоказания. Повышенная чувствительность животных к аминогликозидным антибиотикам. Запрещается применение препаратам курам-несушкам и коровам в период лактации. Не допускается использование совместно с другими аминогликозидными антибиотиками (стрептомицином, неомицином, канамицином, гентамицином, сизомицином) вследствие возможного усиления нефротоксического действия. Воздерживаться от одновременного применения с амфотерицином, цефалоспоринами, осмодиуретиками и мышечными релаксантами.

3.5 Сроки ожидания. Убой телят и поросят на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток, овец — через 30 суток, бройлеров — через 14 суток после последнего введения препарата. Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано на корм плотоядным животным.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 Во время применения препарата следует соблюдать правила личной гигиены и технику безопасности при работе с ветеринарными препаратами.

4.2 При работе с препаратом необходимо использовать респиратор, защитные очки, перчатки.

4.3 После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил применения препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель: Частное торговое унитарное предприятие "Биоветпром", 223016, Минский р-н, д. Королищевичи, ул. Коммунистическая, 41 А, к. 1-1.

Инструкция по применению разработана директором Частного предприятия «Биоветпром» Клеповым С.А.

Ветсиофармсовет при Департаменте ветеринарного и продовольственного контроля МСХ и П РБ
ОДОБРЕНО
Председатель
Секретарь
Эксперт
«24» 01 2012 г., протокол № 01